COBATEST
NETWORK

Мониторинг добровольного консультирования и тестирования на базе сообщества (ДКТБС)

РУКОВОДСТВО ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ АГРЕГИРОВАННЫХ ДАННЫХ

Обновлено: 22.12.2023

Обновлено: 22.12.2023

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 2

ПРИЗНАНИЕ 3

ИНДИКАТОРЫ ДКТБС 5

Основные индикаторы для служб ДКТБС, предлагающих скрининг на ВИЧ 5

Дополнительные индикаторы для служб ДКТБС, предлагающих скрининг на ВИЧ 7

Основные индикаторы для служб ДКТБС, предлагающих скрининг на вирус гепатита С (ВГС)/сифилис/другие заболевания 8

Рекомендации по внедрению руководящих принципов для служб ДКТБС 12

Приложение 1. Уникальный идентификатор COBATEST 13

Приложение 2 : форма сбора данных тестирования 14

Обновлено: 22.12.2023

ВВЕДЕНИЕ

Этот документ был подготовлен для членов сети COBATEST, которые используют собственную систему ввода данных (а не онлайн-инструмент COBATEST), в качестве руководства по представлению агрегированных данных для индикаторов мониторинга и оценки (МиО). В руководстве представлен список индикаторов, необходимых для заполнения индикаторов МиО ДКТБС в формате Excel. Данные индикаторов ДКТБС должны быть извлечены из собственной системы управления данными служб ДКТБС и подготовлены в соответствии со спецификациями.

Файлы данных мониторинга и оценки (МиО) ДКТБС должны представляться в сеть COBATEST ежегодно в следующие сроки:

Данные за период:	**Должны быть представлены до:**
1 января 2017 г. - 31 декабря 2017 г.	31 марта 2018 г.
1 января 2018 г. - 31 декабря 2018 г.	31 марта 2019 г.
1 января 2019 г. - 31 декабря 2019 г.	31 марта 2020 г.
1 января 2020 г. - 31 декабря 2020 г.	31 марта 2021 г.
1 января 2021 г. - 31 декабря 2021 г.	31 марта 2022 г.
1 января 2022 г. - 31 декабря 2022 г.	31 марта 2023 г.
1 января 2023 г. - 31 декабря 2023 г.	31 марта 2024 г.
1 января 2024 г. - 31 декабря 2024 г.	31 марта 2025 г.
1 января 2025 г. - 31 декабря 2025 г.	31 марта 2026 г.
1 января 2026 г. - 31 декабря 2026 г.	31 марта 2027 г.

ПРИЗНАНИЕ

Документ основан на “Основных индикаторах для мониторинга диагностики ВИЧ в службах добровольного консультирования и тестирования на базе сообщества (ДКТБС)” который был разработан в рамках проекта “Практики тестирования на ВИЧ на базе сообщества в Европе” (HIV-COBATEST) при софинансировании исполнительного агентства по здравоохранению и защите прав потребителей (EAHC) в рамках Программы общественного здравоохранения EU (Соглашение о гранте № 2009 12 11). Первоначальный проект был разработан Иреной Клавс (Национальный институт общественного здравоохранения-NIPH, Словения) в сотрудничестве с Джорди Касабоной (Центр эпидемиологических исследований инфекций, передающихся половым путем, и СПИДа Каталонии – CEEISCAT, Испания), Кристиной Агусти Бенито (CEEISCAT), Лаурой Фернандес Лопес (CEEISCAT), Эдуардо Дитцель (Проект NOMS-HISPANOSIDA, Испания), Миха Лобник (LEGEBITRA, Словения) и Пер Слааен Кайе (STOP AIDS, Фонд СПИДа, Дания).

Консенсус по списку основных и дополнительных индикаторов ДКТБС был достигнут в проекте документа на семинаре по основной группе индикаторов для мониторинга диагностики ВИЧ в службах ДКТБС в Барселоне 24 мая 2012 года. Особая благодарность Тобиасу Альфвену (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу - UNAIDS, Швейцария) за его вклад в семинар и все его предложения по улучшению документа.

Помимо всех упомянутых выше лиц, в семинаре приняли участие: Елена Адан (CAS Lluís Companys – Creu Roja, Испания), Майте Аррияга (CEEISCAT), Элисон Браун (Агентство по охране здоровья-HPA, Великобритания), Мишель Бревельери (ULSS 20, Италия), Лайя Феррер (CEEISCAT), Рикардо Фуэртес (CheckpointLX, Португалия), Франк Фунц (AIDS-Hilfe, Германия), Мартина Фурегато (ULSS 20, Италия), Якоб Хафф (Фонд СПИДа, Дания), Михаэль Меулбрук (Проект NOMS-HISPANOSIDA, Испания), Адриана Моралес (STOP SIDA, Испания), Галина Мусат (ARAS, Румыния), Феликс Перес (Проект NOMS-HISPANOSIDA, Испания), Иво Прохазка (Институт сексологии, Чехия), Ферран Пуйоль (Проект NOMS-HISPANOSIDA, Испания), Даниэла Рохас

Кастро (Ассоциация AIDES, Франция), Джорджио Сандрини (Италия), Сильвия Сильва (Àmbit Prevenció-Ámbit Dona, Испания), Игорь Соболев (Эстонская сеть Living People with HIV, Эстония), Юлиус Сабо (Ceska spolecnost AIDS pomoc, Чехия), Инга Упмаке (Балтийская ассоциация ВИЧ, Латвия) и Ивона Вавер (Национальный центр СПИДа Польши).

После семинара по основной группе индикаторов для мониторинга диагностики ВИЧ в службах ДКТБС документ был направлен для окончательных замечаний всем членам Руководящего комитета HIV-COBATEST и членам Консультативного совета проекта HIV-COBATEST, которыми были: Синтия Лемос Менель — сотрудница проекта HIV-COBATEST (Исполнительное агентство по здравоохранению и защите прав потребителей — EAHC, Люксембург), Марита Ван дер Лаар (Европейский центр профилактики и контроля заболеваний — ECDC, Швеция), Луиза Фрескура (UNAIDS), Мартин К. Донохью (Всемирная организация здравоохранения — ВОЗ, Европа, Дания), Бренда Спенсер (Институт социальной и профилактической медицины Университета Лозанны, Швейцария), Рикардо Фернандес (Европейская группа по лечению СПИДа, Бельгия), Йенс Д. Лундгрен (программа по ВИЧ в Европе Национальной университетской больницы и Копенгагенского университета, Дания).

Подготовку итогового документа координировали Ирена Клавс и Кристина Агусти Бенито посредством нескольких раундов рассмотрения по электронной почте и телеконференций при участии Джорди Касабоны, Лауры Фернандес Лопес, Эдуардо Дитцеля, Михи Лобника и Пьер Слааена Кайе.

ИНДИКАТОРЫ ДКТБС

Хотя список основных индикаторов ДКТБС, предложенных выше для услуг мониторинга и оценки ДКТБС, уже довольно длинный, отдельные пункты ДКТБС могут принять решение о мониторинге нескольких дополнительных индикаторов, которые имеют отношение к их конкретным целям и задачам или запрашиваются для мониторинга финансирующими агентствами или донорами. Такие дополнительные индикаторов могут включать показатели качества и содержания консультаций, удовлетворенности клиентов, требований консультантов и т. д. Это может потребовать не только более обширного сбора данных, но и более сложных методов сбора данных (например, интервью при выходе для мониторинга удовлетворенности клиентов (9) или прямое наблюдение за взаимодействием между клиентами и поставщиками для мониторинга соблюдения национальных стандартов качества услуг ДКТБС) и должно быть тщательно рассмотрено.

Основные индикаторы для служб ДКТБС, предлагающих скрининг на ВИЧ

Во-первых, специалисты ДКТБС заполняют контекстные описательные данные о таких услугах, как: тип используемого теста, задействованный персонал, целевые ключевые группы популяции, используемый инструмент сбора данных (стандартизированные анкеты, онлайн-инструмент и т. д.).

Все эти индикаторы, за исключением ДКТБС 10 и ДКТБС 11, также следует контролировать в “дезагрегированной” форме по полу (цисгендерные мужчины, цисгендерные женщины, трансгендерные мужчины, трансгендерные женщины, небинарные), возрасту (<25 и 25+ лет) и ключевым группам риска (МСМ, секс-работники, потребители наркотиков, ЛУИН, мигранты).

Если клиент входит в две или более ключевых группы, его следует регистрировать как такового (например, секс-работник потребитель инъекционных наркотиков должен быть зарегистрирован в двух категориях, а затем один раз в категории «Все»).

Скрининговые тесты на ВИЧ могут быть иммуноферментным анализом (ELISA) или экспресс-тестом. Укажите в контекстных данных.

ДКТБС 1: Количество клиентов, прошедших тестирование на ВИЧ

Для подсчета количества клиентов необходимо использовать уникальный идентификатор, чтобы исключить дублирование тестов и связать информацию, полученную во время разных визитов одного и того же клиента, с информацией об этом же клиенте, полученной из других служб (например, лаборатории тестирования на ВИЧ). Пример уникального идентификатора, рекомендованного COBATEST, см. в Приложении 1.

ДКТБС 2: Доля клиентов, которые сообщили, что ранее проходили тестирование на ВИЧ

$$\frac{\text{Количество клиентов, которые сообщили, что ранее проходили тестирование на ВИЧ}}{\text{Количество клиентов, прошедших скрининг на ВИЧ}} \times 100$$

ДКТБС 3: Доля клиентов, которые сообщили,что проходили тестирование на ВИЧ в течение предыдущих 12 месяцев

$$\frac{\text{Количество клиентов, которые сообщили, что проходили тестирование на ВИЧ в течение предыдущих 12 месяцев}}{\text{Количество клиентов, прошедших скрининг на ВИЧ}} \times 100$$

ДКТБС 4: Доля клиентов с реактивным результатом скринингового теста на ВИЧ

$$\frac{\text{Количество клиентов с реактивным результатом скринингового теста}}{\text{Количество клиентов, прошедших скрининг на ВИЧ}} \times 100$$

ДКТБС 5: Доля клиентов с реактивным результатом скринингового теста на ВИЧ, прошедших подтверждающий тест на ВИЧ

Для клиентов с реактивным тестом на ВИЧ подтверждающее тестирование обычно проводится в медицинском учреждении с тестом четвертого поколения. Регистрация этого будет зависеть от того, отчитается ли клиент в ДКТБС или даст ли он разрешение на последующее наблюдение.

$$\frac{\text{Количество клиентов с реактивным скрининговым тестом которые прошли подтверждающий тест на ВИЧ}}{\text{Количество клиентов с реактивным скрининговым тестом на ВИЧ}} \times 100$$

ДКТБС 6: Доля клиентов с положительным подтверждающим результатом теста на ВИЧ

$$\frac{\text{Количество клиентов с положительным подтверждающим тестом на ВИЧ}}{\text{Количество клиентов с реактивным скрининговым тестом на ВИЧ}} \times 100$$

ДКТБС 7: Доля клиентов с ложноположительными результатами

$$\frac{\text{Количество клиентов с ложноположительными результатами}}{\text{Количество клиентов, прошедших скрининг на ВИЧ}} \times 100$$

ДКТБС 8: Количество клиентов, которых необходимо протестировать для обнаружения положительного результата на ВИЧ

$$\frac{\text{Количество протестированных клиентов}}{\text{Количество клиентов с положительным подтверждающим тестом на ВИЧ}} \times 100$$

Дополнительные индикаторы для служб ДКТБС, предлагающих скрининг на ВИЧ

ДКТБС 9: Стоимость одного клиента, прошедшего скрининг на ВИЧ

$$\frac{\text{Общая операционная стоимость услуги ДКТБС}}{\text{"Количество клиентов,прошедших скрининг на ВИЧ"}}$$

ДКТБС 10: Стоимость одного подтвержденного диагноза ВИЧ

$$\frac{\text{Общая операционная стоимость услуги ДКТБС}}{\textit{Количество клиентов с подтвержденной ВИЧ-инфекцией}}$$

ДКТБС 11: Доля клиентов с подтвержденным диагнозом ВИЧ, которые были связаны с медицинской помощью

Определение OptTest привязки к лечению: доля пациентов, обратившихся за помощью в связи с ВИЧ (измеряется по первому показателю CD4 и/или вирусной нагрузкой и/или датой посещения и/или датой начала лечения). Большинство служб ДКТБС считают датой начала лечения день первого посещения медицинского учреждения. Быстрая привязка: привязка в течение 3 месяцев с момента постановки диагноза. Регистрация этой переменной будет зависеть от согласия клиента поделиться этой информацией либо самостоятельно, либо через систему здравоохранения.

$$\frac{\text{Количество клиентов с подтвержденной ВИЧ – инфекцией, которые были связаны с медицинской помощью}}{\text{Количество клиентов с подтвержденной ВИЧ-инфекцией впервые прошедших скрининг в ДКТБС}} \times 100$$

Основные индикаторы для служб ДКТБС, предлагающих скрининг на вирус гепатита С (ВГС)/сифилис/другие заболевания

Если ваша служба ДКТБС предлагает скрининг на ВГС, сифилис, ВГВ или другие заболевания, заполните дополнительный лист в Excel для каждого заболевания. Используемые тесты должны быть указаны на первом листе в контекстной информации.

Индикаторы ДКТБС 1–8 также следует отслеживать в “дезагрегированной” форме по полу (цисгендерные мужчины, цисгендерные женщины, трансгендерные мужчины, трансгендерные женщины, небинарные), возрасту (<25 и 25+ лет) и ключевым группам риска (МСМ, секс-работники, потребители наркотиков, ЛУИН, мигранты).

Если клиент входит в две или более ключевые группы, его следует регистрировать как такового (например, секс-работник потребитель инъекционных наркотиков должен быть зарегистрирован в двух категориях, а затем один раз в категории «Все»).

ДКТБС ИППП 1: Количество клиентов, прошедших тестирование на [ВГС/сифилис/ВГВ/другие ИППП] с помощью скринингового теста

Для подсчета количества клиентов необходимо использовать уникальный идентификатор клиентов чтобы исключить дублирование тестов и связать информацию, полученную во время разных визитов одного и того же клиента. Пример уникального идентификатора, рекомендованного COBATEST, см. в Приложении 1.

ДКТБС ИППП 2: Доля клиентов, которые сообщили, что ранее проходили тестирование на [ВГС/сифилис/ВГВ/другие ИППП]

$$\frac{\text{Количество клиентов, которые сообщили, что ранее проходили тестирование на ВГС или сифилис}}{\text{Количество клиентов, прошедших скрининг на [ВГС/сифилис/ВГВ/другие ИППП]}} \times 100$$

ДКТБС ИППП 3: Доля клиентов, которые сообщили, что у них ранее был диагностирован [ВГС/сифилис/ВГВ/другие ИППП]

$$\frac{\text{Количество клиентов, которые сообщили, что у них ранее был диагностирован ВГС или сифилис}}{\text{Количество клиентов, прошедших скрининг на [ВГС/сифилис/ВГВ/другие ИППП]}} \times 100$$

ДКТБС ИППП 4: Доля клиентов, которые сообщили, что у них ранее был диагностирован [ВГС/сифилис/ВГВ/другие ИППП] в течение предыдущих 12 месяцев

$$\frac{\text{Количество клиентов, которые сообщили, что у них ранее был диагностирован ВГС или сифилис в течение предыдущих 12 месяцев}}{\text{"Количество клиентов, прошедших скрининг на [ВГС/сифилис/ВГВ/другие ИППП]"}} \times 100$$

ДКТБС ИППП 5: Доля клиентов с реактивным результатом скринингового теста [ВГС/сифилис/ВГВ/другие ИППП]

$$\frac{\text{Количество клиентов с реактивным скрининговым тестом}}{\text{Количество клиентов, прошедших скрининг на [ВГС/сифилис/ВГВ/другие ИППП]"}} \times 100$$

ДКТБС ИППП 6: Доля клиентов с реактивным результатом скринингового теста [ВГС/сифилис/ВГВ/другие ИППП], которые прошли подтверждающий тест на [ВГС/сифилис/ВГВ/другие ИППП]

$$\frac{\text{Количество клиентов с реактивным скрининговым тестом которые прошли подтверждающий тест на ВГС или сифилис}}{\text{Количество клиентов с реактивным скрининговым тестом [ВГС/сифилис/ВГВ/другие ИППП]}} \times 100$$

ДКТБС ИППП 7: Доля клиентов с диагнозом активной инфекции [ВГС/сифилис/ВГВ/другие ИППП]

$$\frac{\text{Количество клиентов с положительным подтверждающим тестом на ВГС или сифилис}}{\text{Количество клиентов с реактивным скрининговым тестом на ВГС или сифилис}} \times 100$$

ДКТБС ИППП 8: Доля клиентов с диагнозом старой инфекции [ВГС/сифилис/ВГВ/другие ИППП]

$$\frac{\text{Количество клиентов с диагнозом старой инфекции ВГС или сифилис}}{\text{Количество клиентов, прошедших скрининг на [ВГС/сифилис/ВГВ/другие ИППП]}} \times 100$$

ДКТБС ИППП 9: Стоимость одного клиента, прошедшего скрининг на [ВГС/сифилис/ВГВ/другие ИППП]

$$\frac{\text{Общая операционная стоимость услуги ДКТБС}}{\text{Количество клиентов,прошедших скрининг на [ВГС/сифилис/ВГВ/другие ИППП]}}$$

ДКТБС ИППП 10: Стоимость одного подтвержденного диагноза [ВГС/сифилис/ВГВ/другие ИППП]

$$\frac{\text{Общая операционная стоимость услуги ДКТБС}}{\textit{Количество клиентов с подтвержденной инфекцией} \text{ [ВГС/сифилис/ВГВ/другие ИППП]}}$$

ДКТБС ИППП 11: Доля клиентов с подтвержденным диагнозом [ВГС/сифилис/ВГВ/другие ИППП], которые были связаны с медицинской помощью

$$\frac{\text{Количество клиентов с подтвержденной инфекцией [ВГС или сифилис], которые были связаны с медицинской помощью}}{\text{Количество клиентов с подтвержденной инфекцией [ВГС/сифилис/ВГВ/другие ИППП] впервые прошедших скрининг в ДКТБС}} \times 100$$

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ ДЛЯ СЛУЖБ ДКТБС

Мониторинг и оценка (МиО) ДКТБС на уровне индивидуальных услуг требуют выделения ресурсов, таких как рабочее время персонала и логистическая поддержка, которые должны быть запланированы заранее. Помощь в подготовке данных для представления можно запросить у координирующей организации сети COBATEST.

Для отдельных служб ДКТБС включение индикаторов ДКТБС в их мониторинг и оценку предоставит стандартизированную на международном уровне информацию для улучшения их услуг и позволит им с течением времени сравнивать свою эффективность с другими аналогичными службами. Отдельные службы ДКТБС также могут использовать такие результаты мониторинга и оценки для пропаганды служб ДКТБС в дополнение к услугам ДКТБС на базе здравоохранения и для предоставления доказательств их хорошей эффективности при поиске финансирования. Такой стандартизированный подход также позволит сравнивать данные мониторинга и оценки ДКТБС в рамках Европейской сети HIV-COBATEST, между службами ДКТБС в государствах-членах и на международном уровне.

Большинство необходимых элементов данных для предлагаемых индикаторов ДКТБС можно собрать в службах ДКТБС путем ведения рутинных записей. Для оценки последних двух очень важных дополнительных индикаторов ДКТБС следует получить дополнительную информацию о клиентах, у которых в службах ДКТБС был диагностирован ВИЧ-положительный статус, либо из медицинских служб, в которые они были направлены, либо из национальной системы эпиднадзора за ВИЧ. Это потребует участия и сотрудничества соответствующих местных заинтересованных сторон и использования общих уникальных идентификационных данных. При обсуждении доступа к таким данным следует тщательно рассмотреть вопросы защиты персональных данных и при необходимости, получить согласие местного комитета по медицинской этике.

Пример формы сбора данных основных индикаторов ДКТБС приведен в Приложении 2. Эта форма была разработана для использования службами ДКТБС, которые будут членами сети HIV-COBATEST, для отправки данных координатору HIV-COBATEST. Форму также можно использовать для отправки данных в национальную программу профилактики, лечения и ухода при ВИЧ/СПИДе для использования в целях национального мониторинга и оценки ДКТБС в рамках национальной программы НТС.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УНИКАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР COBATEST

Уникальный идентификатор COBATEST состоит из букв и цифр и основан на ответах на пять вопросов.



Пол: числовой (0 — цис-мужчина, 1 — цис-женщина, 2 — транс-мужчина, транс-женщина, небинарный или другой).

Дата рождения: числовая (ДДММГГГГ).

Количество старших братьев: числовое.

Количество старших сестёр: числовое.

Первая буква имени матери: по алфавиту.

Обновлено: 22.12.2023

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 : ФОРМА СБОРА ДАННЫХ ТЕСТИРОВАНИЯ



COBATEST NETWORK

HIV, SYPHILIS, HCV AND HBV TESTING DATA COLLECTION FORM

Name of the CBVCT site: _____

City of the CBVCT site: _____

Date of visit: Day / Month / Year

Testing site: ☐ CBVCT office ☐ Outdoors/Van ☐ Sex work venue ☐ Sauna/sex venue ☐ Public venue (pharmacy, library) ☐ Amusement venue (coffe,bar) ☐ Needle exchange venue ☐ Other: _____

Who provides the testing: ☐ Health professional ☐ Lay worker (no peer) ☐ Peer ☐ Other: _____

User's Unique identifier (used by the CBVCT service): _____

OR

User's Unique identifier (COBATEST): Gender (0 cis man, 1 cis woman, 2 trans man, trans woman or non-binary) | Day | Month of birth | Year | N of older brothers | N of older sisters | Initial letter of mother's name

Client's characteristics:

Gender: ☐ Man (cis) ☐ Woman (cis) ☐ Trans man ☐ Trans woman ☐ Non-binary ☐ Other: _____ Date of birth: Day / Month / Year

Foreign national: ☐ Yes → Country of birth: _____ → Year of arrival to this country: *(if migrant)* Year
☐ No → Is the client a: ☐ Tourist ☐ Long-term stay → ☐ Foreign student ☐ Foreign worker ☐ Asylum seeking migrant ☐ Refugee ☐ Undocumented migrant ☐ Naturalized citizen ☐ Resident ☐ Other: _____
☐ Don't know

Municipality or home town: _____

Do you have access to free health care services? ☐ Yes ☐ No ☐ Don't know ☐ Other: _____

Have you been homeless during past 12 months? *(living on the street, in a shelter, in a car...)* ☐ Yes, currently ☐ Yes, but not currently ☐ No ☐ Don't know ☐ Refuse to answer

Reasons for testing: (multiresponse)

☐ **Risk exposition**
- ☐ Unprotected vaginal sex
- ☐ Unprotected anal sex
- ☐ Unprotected oral sex
- ☐ Broken condom
- ☐ Unprotected sex with sex worker
- ☐ My partner has tested positive recently
- ☐ Episode of sharing injection material
- ☐ Other: _____

☐ **For control/screening**
- ☐ My partner asked me to
- ☐ Before dropping using condom with my partner
- ☐ I wish to have a baby
- ☐ Prenatal screening: before delivery
- ☐ Regular control
- ☐ Only to know my health status
- ☐ I want to start PrEP / Monitoring PrEP
- ☐ Other: _____

☐ **Window period in the last test**

☐ **Clinical symptoms**

☐ **Other:** _____

Reasons for selecting this CBVCT center to be tested: (multiresponse)

- ☐ I've come here before
- ☐ A friend told me about this CBVCT
- ☐ I've seen this CBVCT in a pamphlet
- ☐ I've found this CBVCT in internet
- ☐ Other: _____

Behavioural factors:

Sex in the last 12 months with *(multianswer)*: ☐ Men (cis) ☐ Women (cis) ☐ Trans men ☐ Trans women ☐ Non-binary ☐ I haven't had sex ☐ Don't know

Condom use in the last sexual relation with penetration: ☐ Yes ☐ No ☐ Don't know

Received money, drugs, good or services for sex in the last 12 months: ☐ Yes ☐ No ☐ Don't know

STI diagnosed in the last 12 months: ☐ Yes ☐ No ☐ Don't know

Drugs use? ☐ Yes ☐ No ☐ Don't know

Drugs use route? *(multianswer)*:
- ☐ Injecting → Last time: ☐ Less than 30 days ☐ Less than 12 months ☐ Ever ☐ Don't know
- ☐ Sniffing/Snorting → Last time: ☐ Less than 30 days ☐ Less than 12 months ☐ Ever ☐ Don't know
- ☐ Smoking → Last time: ☐ Less than 30 days ☐ Less than 12 months ☐ Ever ☐ Don't know
- ☐ Oral → Last time: ☐ Less than 30 days ☐ Less than 12 months ☐ Ever ☐ Don't know
- ☐ Other → Which other? _____

Main drugs used: *(multianswer)*: ☐ Cannabis ☐ Cocaine / Crack cocaine ☐ Amphetamine / metamphetamine ☐ MDMA ☐ Heroin / other opioids ☐ New psychoactive substances ☐ Other: _____

Using material of injection that were already used by others in the last 12 months, as: Syringes and/or needles ☐ Yes ☐ No ☐ Don't know; Spoons, filters, water... ☐ Yes ☐ No ☐ Don't know

Using other material for non-injecting drug use that were already used by others in the last 12 months? ☐ Yes ☐ No ☐ Don't know

Have you injected drugs in prison? ☐ Yes ☐ No ☐ Never in prison ☐ Don't know

Are you at opioid agonist treatment currently? ☐ Yes ☐ No ☐ Don't know

STI vaccinations:

Vaccination for Hepatitis A (with all required dosis)	☐ Yes	☐ No	☐ Don't know
Vaccination for Hepatitis B (with all required dosis)	☐ Yes	☐ No	☐ Don't know
Vaccination for Papilloma virus (with all required dosis)	☐ Yes	☐ No	☐ Don't know
Vaccination for Mpox (with all required dosis)	☐ Yes	☐ No	☐ Don't know


Testing:
Screening HIV test:
Previous HIV tests
Yes
No
Don't know
Last HIV test performed:
Less than 3 months
More than 12 months
Less than 12 months
Don't know
Previous HIV diagnosis
Yes
No
Don't know
Year of HIV diagnosis :
Year
Are you on treatment?
Yes
No
Don't know
HIV test performed
Yes
No
Type of test used:
Rapid blood test
Rapid oral test
Conventional test (Elisa)
Screening test result:
Reactive
Non reactive
Undetermined
Did you perform an extra test?
Yes
No
Don't know
Which type of test?
Rapid blood test
Rapid oral test
Conventional test (Elisa)
Test result:
Reactive
Non reactive
Confirmatory test performed
Yes
No
Don't know
Confirmatory HIV test result :
Positive
Negative
Inconclusive
Patient referred to healthcare system
Yes
No
Don't know
Patient linked to healthcare system
Yes
No
Don't know
Date of linkage:
Day
Month
Year
Syphilis test:
Previous syphilis tests
Yes
No
Don't know
Last syphilis test performed:
Less than 3 months
More than 12 months
Less than 12 months
Don't know
Previous syphilis diagnosis
Yes
No
Don't know
Year of last syphilis diagnosis :
Year
Syphilis test performed
Yes
No
Type of test used:
Rapid test
Conventional test
Confirmatory test performed?
Yes
No
Don't know
Screening test result:
Reactive
Non reactive
Syphilis diagnosis:
Active infection
Serological scar (old or cured infection)
Unknown
Negative
Patient referred to healthcare system
Yes
No
Don't know
Patient linked to healthcare system
Yes
No
Don't know
Date of linkage:
Day
Month
Year
HCV test
Previous HCV test
Yes
No
Don't know
Last HCV test performed:
Less than 3 months
More than 12 months
Less than 12 months
Don't know
Previous HCV diagnosis
Yes
No
Don't know
Year of last HCV diagnosis:
Year
Have you received treatment?
Yes
No
Don't know
Which treatment?
Interferon
New DAA
Don't know
Treatment completed
Stopped treatment
Don't know
Treatment completed
On treatment
Stopped treatment
Don't know
HCV test performed
Yes
No
Type of test used:
Rapid oral test
Rapid blood test
Conventional test
HCV RNA test performed?
Yes
No
Don't know
Screening test result:
Reactive
Non reactive
HCV diagnosis:
Active infection
Serological scar (old or cured infection)
Unknown
Negative
Patient referred to healthcare system
Yes
No
Don't know
Patient linked to healthcare system
Yes
No
Don't know
Date of linkage:
Day
Month
Year
HBV test
Previous HBV test
Yes
No
Don't know
Last HBV test performed:
Less than 3 months
More than 12 months
Less than 12 months
Don't know
Previous HBV diagnosis
Yes
No
Don't know
Year of HBV diagnosis:
Year
HBV test performed
Yes
No
Type of test used:
Rapid blood test
Conventional test
Confirmatory test performed?
Yes
No
Don't know
Screening test result:
Reactive
Non reactive
Diagnosed as:
Acute infection
Past cured infection
Healthy carrier
Don't know
Chronic infection
HBV diagnosis:
Positive
Negative
Unknown
Patient referred to healthcare system
Yes
No
Don't know
Patient linked to healthcare system
Yes
No
Don't know
Date of linkage:
Day
Month
Year
Comments: